



UM IMUNIZANTE PARA CADA FASE DA VIDA

Desde o nascimento até chegar à 3ª idade, é preciso tomar vacina.

De 0 a 6 meses

Ao nascer

- **Vacina BCG (dose única)**
Evita formas graves da tuberculose (miliar e meníngea)
- **Vacina Hepatite B (recombinante HB)**
Evitada hepatite B

2 meses

- **Vacina adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta) (1ª dose)**
Evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B
- **Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (1ª dose)**
Evita Poliomielite
- **Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) - (Pneumo 10) (1ª dose)**
Evita infecções invasivas (como [meningite](#) e pneumonia) e otite média aguda
- **Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH) (1ª dose)**
Evita diarreia por [rotavírus](#) (gastroenterites)

3 meses

- **Vacina meningocócica C (conjugada) - (Meningo C) (1ª dose)**
Evita doenças invasivas causada pela *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C
-

4 meses

- **Vacina adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta) (2ª dose)**
 - **Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (2ª dose)**
 - **Vacina pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10) (2ª dose)**
 - **Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH) (2ª dose)**
-

5 meses

- **Vacina meningocócica C (conjugada) - (Meningo C) (2ª dose)**
-

6 meses

- **Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta) (3ª dose)**
- **Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (3ª dose)**
- **Vacina Covid-19 (1ª dose)**
- **Evita as formas graves e complicações pela [covid-19](#)**

A vacina Covid-19 é recomendada com esquema de duas doses (aos 6 e 7 meses de idade), respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas entre a 1ª e 2ª dose.



7 a 15 meses

7 meses

- **Vacina Covid-19 (2ª dose)**

A vacina Covid-19 é recomendada com esquema de duas doses (aos 6 e 7 meses de idade), respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas entre a 1ª e 2ª dose.

9 meses

- **Vacina Febre Amarela (atenuada) - (FA) (1 dose)**

Evita a febre amarela

12 meses

- **Vacina pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10) (Reforço)**
 - **Vacina meningocócica C (conjugada) - (Meningo C) (Reforço)**
 - **Vacina sarampo, caxumba, rubéola (tríplice viral) (1ª dose)**
Evita sarampo, caxumba e rubéola
-

15 meses

- **Vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP) (1º reforço)**
- **Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (Reforço)**
- **Vacina adsorvida hepatite A (HA - inativada) (1 dose)**
Evita hepatite A
- **Vacina Tetra viral (1 dose)**
Evita sarampo, caxumba, rubéola e varicela



4 a 10 anos

4 anos

- Vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP) (2º reforço)
 - Vacina febre amarela (atenuada) (Reforço)
 - Vacina varicela (monovalente) - (varicela) (1 dose)
Evita varicela
-

5 anos

- Vacina Febre Amarela (atenuada) - (FA) (1 dose, caso a criança não tenha recebido as duas doses recomendadas antes de completar 5 anos)
 - Vacina pneumocócica 23-valente - (Pneumo 23) (2 doses, a 2ª dose deve ser feita 5 anos após a 1ª dose)
-

7 anos

- Vacina difteria e tétano (dT) - (Iniciar ou completar três doses, de acordo com situação vacinal)
Reforço a cada 10 anos, ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves e contatos de difteria.
-

9 e 10 anos

- Vacina HPV Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 - recombinante) (Dose única)
Evita Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18



A partir de 18 anos

- Vacina difteria, tétano, pertussis (uma dose com reforço a cada 10 anos)



20 a 59 anos

- Vacina Tríplice viral
Evita sarampo, caxumba e rubéola



A partir de 60 anos

- Vacina Hepatite B
- Vacina difteria e tétano
- Vacina febre amarela
- Vacina difteria, tétano, pertussis

Fonte: Ministério da Saúde [1](#) e [2](#)

